## 使用上の注意改訂のお知らせ

2022年5月

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

副腎皮質ホルモン剤

**デカドロン**®注射液1.65mg デカドロン®注射液3.3mg デカドロン<sup>®</sup>注射液6.6mg

オルガドロン。注射液 1.9mg オルガドロン。注射液3.8mg オルガドロン。注射液 19mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。 今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】下線部\_\_\_\_\_:変更箇所

・デカドロン注射液 1.65mg・3.3mg・6.6mg

改 訂 後	改 訂 前
8. 重要な基本的注意	8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉	〈効能共通〉
8.1~8.4 省略	8.1~8.4 省略
8.5 褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサ	新設
メタゾン製剤(経口剤及び注射剤)を投与した際に褐色	
細胞腫クリーゼを発現したとの報告がある。本剤投与後	
に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合は、	
<u>褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置</u>	
<u>を行うこと。[9.1.12 参照]</u>	
<u>8.6~8.8</u> 省略	<u>8.5</u> ~ <u>8.7</u> 省略
9. 特定の背景を有する患者に関する注意	9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1.1~9.1.11 省略	9.1.1~9.1.11 省略
9.1.12 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及	新設
びその疑いのある患者褐色細胞腫クリーゼがあらわれ	
ることがある。[8.5 参照]	

## ・オルガドロン注射液 1.9mg・3.8mg・19mg

改 訂 後	改 訂 前
【使用上の注意】	【使用上の注意】
1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)	1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
(1)~(10) 省略	(1)~(10) 省略
(11) 褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及び	新設
その疑いのある患者 [褐色細胞腫クリーゼがあらわれ	
ることがある。]_	
2. 重要な基本的注意	2. 重要な基本的注意
(1)~(5) 省略	(1)~(5) 省略
(6) 褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサ	新設
メタゾン製剤(経口剤及び注射剤)を投与した際に褐	
<u>色細胞腫クリーゼを発現したとの報告がある。本剤投</u>	
与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場	
合は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切	
な処置を行うこと。	
<u>(7)</u> ∼ <u>(8)</u> 省略	<u>(6)</u> ∼ <u>(7)</u> 省略

サンドファーマ株式会社

サンド株式会社

## 【改訂理由】

デキサメタゾン(注射剤)を含む副腎皮質ステロイドにおいて褐色細胞腫クリーゼとの因果関係が否定できない症例<sup>1)</sup>が集積されたことから、「重要な基本的注意」の項及び「特定の背景を有する患者に関する注意」又は「慎重投与」の項に追記し、注意喚起することといたしました。

1) Takagi S, et al.: Jpn Circ J. 2000;64(10):785-788

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No. 308」に掲載されます。

改訂添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(https://www.pmda.go.jp/)及び弊社ホームページ「医療関係者向け情報」(https://www.sandoz.jp/products) に掲載されます。

## 【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ フリーコール (0120) 982-001 FAX(03) 6257-3633 受 付 時 間 9:00~17:00(土・日、祝日及び当社休日を除く)