

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

勃起不全治療剤

2022年5月

タダラフィル錠 10mgCI「FCI」

製造販売元

タダラフィル錠 20mgCI「FCI」

Tadalafil Tablets 10mg CI「FCI」, Tadalafil Tablets 20mg CI「FCI」

タダラフィル錠



富士化学工業株式会社

富山県中新川郡上市町郷柿沢1番地

処方箋医薬品 注意－医師の処方箋により使用すること

この度、標記製品の「使用上の注意」を自主改訂により改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

■ 改訂内容（_____:追記）

改 訂 後			改 訂 前		
3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること)			3. 相互作用 (2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ペルシグアト	症候性低血圧を起こすおそれがある。治療所の有益性と危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。	細胞内cGMP濃度が増加し、高圧作用を増強するおそれがある。	省略	省略	省略

該当項目のみ記載

■ 改訂理由

自主改訂

「相互作用 併用注意」の項

相互作用の相手製剤と整合性をとるため、改訂いたしました。

■ 製品情報お問い合わせ先

富士化学工業株式会社 学術担当

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目8番21号

TEL: (03) 6435-6956

FAX: (03) 6435-9912

受付時間:9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

改訂内容は、日本製薬団体連合会発行「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No. 308、2022年6月」に掲載されます。

また、最新の添付文書につきましては医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)または弊社医薬関係者様向けホームページ(<http://www.fujichemical.co.jp/generic/index.html>)をご参照ください。