

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2022年5月

製造販売元 江州製薬株式会社

勃起不全治療剤
タダラフィル錠

タダラフィル錠10mgCI「GO」 タダラフィル錠20mgCI「GO」

謹啓 時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、標記製品に関しまして「使用上の注意」を改訂致しますのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

1.改訂内容[改訂箇所: _____部]

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
3.相互作用 本剤は主に CYP3A4 により代謝される。 (1)併用禁忌(併用しないこと) 省略 (2)併用注意(併用に注意すること)			3.相互作用 本剤は主に CYP3A4 により代謝される。 (1)併用禁忌(併用しないこと) 省略 (2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略	省略	省略	省略	省略	省略
ベルイシグアト	症候性低血圧を起こすおそれがある。治療上の有益性と危険性を十分に考慮し、治療上やむを得ないと判断された場合にのみ併用すること。	細胞内、cGMP濃度が増加し、降圧作用を増強するおそれがある。	←追記		

2. 改訂理由：

自主改訂により「相互作用」の項を改訂致しました。

3. 本情報は DSU(医薬品安全対策情報)No. 308(2022年6月上旬発送予定)に掲載されます。

4. 添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ

(URL:<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」においてもご確認いただけます。

以上