

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年5月
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
日本薬局方 アスピリン

アスピリン「ヨシダ」

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品につきまして、**使用上の注意**を改訂(自主改訂)致しましたのでお知らせ申し上げます。

なお、流通在庫の関係から改訂添付文書が封入された製品がお手元に届くまで若干の日時を要しますので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

1. 改訂内容 (改訂箇所抜粋)

自主改訂による追記： ____部

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】 4. 副作用 略 (1) 重大な副作用 1) ~6) 略 7) 消化性潰瘍、小腸・大腸潰瘍 (頻度不明) : 下血 (メレナ) を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等の消化性潰瘍があらわれることがある。また、消化管出血、腸管穿孔、<u>狭窄・閉塞</u>を伴う小腸・大腸潰瘍があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>	<p>【使用上の注意】 4. 副作用 略 (1) 重大な副作用 1) ~6) 略 7) 消化性潰瘍、小腸・大腸潰瘍 (頻度不明) : 下血 (メレナ) を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等の消化性潰瘍があらわれることがある。また、消化管出血、腸管穿孔を伴う小腸・大腸潰瘍があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>

2. 改訂理由

自主改訂 :

潰瘍に伴い狭窄・閉塞を発現した症例の集積があることから、「重大な副作用」の項「消化性潰瘍、小腸・大腸潰瘍」の本文中に「狭窄・閉塞」を追記することに致しました。

改訂は、医薬品安全対策情報 (DSU) No. 308 (2022年6月) に掲載される予定です。添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) 又は、吉田製薬株式会社ホームページ (<https://www.yoshida-pharm.jp/>) 医療関係者向けヨシダ製薬製品情報サイトをご覧ください。



製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951