医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

抗血小板剤

日本薬局方クロピドグレル硫酸塩錠

クロピドグレル錠25mg「FFP」
クロピドグレル錠75mg「FFP」

Clopidogrel Tablets「FFP」

処方箋医薬品（注意-医師等の処方箋により使用すること）

2022年5月

製造販売元　共創未来ファーマ株式会社

このたび、標記製品の添付文書を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後の本剤のご使用に際しましては、本文書の内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。なお、流通在庫の関係から改訂した添付文書を封入した製品が、お手元に届くまで若干の日数を必要とします。

今回の使用上の注意の項の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の医薬品安全対策情報（DSU）No. 308（2022年6月発行）に掲載される予定です。

1. 改訂内容（改訂部分抜粋、＿＿＿（下線）部は追加・改訂箇所）

<table>
<tr><th>変　更　後</th><th>変　更　前</th></tr>
<tr><td>
■使用上の注意
3. 相互作用
省　略（変更なし）
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">省　略（変更なし）</td></tr>
<tr><td>ロスバスタチン</td><td>本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのCmaxが1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのCmaxには影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。</td><td>本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。</td></tr>
</table>
</td><td>
■使用上の注意
3. 相互作用
省　略
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">省　略</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. 改訂理由

先発医薬品のCCDS*変更により改訂しました。

＊CCDS（Company Core Data Sheet：企業中核データシート）：世界で初めてその薬剤の承認を取得した企業が作成している添付文書を作成する際に基準となる製品情報文書です。そのなかには安全性情報のほか、適応症、用法・用量、薬理学、製品に関するその他の情報が含まれ、世界中から集積された安全性情報を評価し、最新の情報が反映されるように逐次改訂が行われます。

最新の電子化された添付文書は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」（https://www.pmda.go.jp）並びに弊社ホームページ（http://www.kyosomirai-p.co.jp/）でご参照いただけます。
また、以下のGS1コードを、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で、読み取ることでもご確認いただけます。

クロピドグレル錠25mg「FFP」

(01)14987885020176

クロピドグレル錠75mg「FFP」

(01)14987885020190

製造販売元
共創未来ファーマ株式会社
東京都品川区広町１－４－４

【お問い合わせ先】
共創未来ファーマ株式会社 お客様相談室
〒155-8655 東京都世田谷区代沢５－２－１
TEL 050-3383-3846