重要な情報が記載されています
ので、必ずお読み下さい。

令和 4 年 5 月 － 6 月

金沢市久安 3 丁目406番地
辰巳化学株式会社

抗血小板剤

日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠
クロピドグレル錠25mg「TCK」
クロピドグレル錠50mg「TCK」
クロピドグレル錠75mg「TCK」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、**令和４年５月付でクロピドグレル錠 25mg「TCK」、クロピドグレル錠 50mg「TCK」及びクロピドグレル錠 75mg「TCK」の「使用上の注意」の改訂**を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬　具

■　改訂箇所

〰〰〰 自主改訂による変更箇所

<table>
<tr><th>改　訂　後</th><th>改　訂　前</th></tr>
<tr><td>【使用上の注意】
3. 相互作用
現行の通り
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">現行の通り</td></tr>
<tr><td>ロスバスタチン</td><td>本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのCmaxが1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのCmaxには影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。</td><td>本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。</td></tr>
</table></td><td>【使用上の注意】
3. 相互作用
省略
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">省略</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

なお、他の項は現行の通りとする。

■ **改訂理由**

同一成分薬での CCDS（企業中核データシート）の変更による。

改訂内容につきましては、令和４年６月発行予定の「医薬品安全対策情報（DSU）No.308」に掲載されます。また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ（https://www.tatsumi-kagaku.com/）及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ（https://www.pmda.go.jp/）に掲載されますので、併せてご利用下さい。なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。

(01)14987124150015