医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年5月

抗血小板剤
日本薬局方　クロピドグレル硫酸塩錠

処方箋医薬品注)

クロピドグレル錠25mg「杏林」
クロピドグレル錠75mg「杏林」
CLOPIDOGREL Tablets "KYORIN"

製造販売元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売の**クロピドグレル錠25mg「杏林」／クロピドグレル錠75mg「杏林」**の「使用上の注意」を一部改訂致しましたのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1．改訂内容（下線＿＿部：改訂箇所）

改訂後

［併用注意］（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
―省略―		
ロスバスタチン	本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのCmaxが1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのCmaxには影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。	本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。

改訂前

［併用注意］（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
―省略―		

2．改訂理由

先発医薬品CCDS※の変更のため、次のとおり自主改訂いたしました。
・「併用注意」の項、「ロスバスタチン」の欄を追記いたしました。

※CCDS Company Core Data Sheet ：企業中核データシート）：医薬品市販承認取得者が作成している各国の添付文書を作成する際に基準となる文書で、安全性情報、効能・効果、用法・用量等の情報が記載されています。世界中から集められた安全性情報を評価し、最新の情報が反映されるよう、逐次改訂が行われています。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載される予定です。なお、改訂後の最新添付文書は弊社ホームページ https://www.med.kyorin-rmd.com/ 及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ https://www.pmda.go.jp/ に掲載されています。併せてご利用ください。
本製品の電子添文はこちらのGS1コードからご覧ください。

クロピドグレル錠25mg・75mg「杏林」
(01)14987060306682

医療関係者向けWebサイト
https://www.med.kyorin-rmd.com/
本件に関するお問い合わせ
キョーリン リメディオ株式会社　学術部
TEL 0120-960189　FAX 0120-189099