―― 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。――

使用上の注意改訂のお知らせ

KAKEN D.I.

2022 年 5 月

抗血小板剤
日本薬局方　クロピドグレル硫酸塩錠

クロピドグレル錠25mg「科研」
クロピドグレル錠75mg「科研」

Clopidogrel Tab.

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂しましたので、お知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、本改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

■改訂内容（＿＿＿：改訂・追記部分）

<table>
<tr><th>改　訂　後</th><th>改　訂　前</th></tr>
<tr><td>3. 相互作用
（省略、変更なし）
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">（省略、変更なし）</td></tr>
<tr><td>モルヒネ</td><td colspan="2">（省略、変更なし）</td></tr>
<tr><td>ロスバスタチン</td><td>本剤 300mg の投与後、ロスバスタチンの Cmax が 1.3 倍、AUC が 2 倍上昇し、本剤 75mg の反復投与後、ロスバスタチンの Cmax には影響せず、AUC が 1.4 倍上昇したとの報告がある。</td><td>本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。</td></tr>
</table></td><td>3. 相互作用
（省略）
併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">（省略）</td></tr>
<tr><td>モルヒネ</td><td colspan="2">（省略）</td></tr>
</table>
←追加</td></tr>
</table>

■改訂理由

同一成分薬の使用上の注意の改訂に伴い、自主改訂により「併用注意」の項を改訂いたしました。

・今回の改訂内容は、「医薬品安全対策情報（DSU）No.308」（2022年6月）に掲載されます。
・最新の電子化された添付文書は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）及び弊社ホームページ（https://www.kaken.co.jp/medical/index.html）でご覧いただくことができます。また、添付文書閲覧アプリ「添文（てんぶん）ナビ®」を利用し、GS1バーコードを読み取ることでご覧いただくこともできます。

クロピドグレル錠「科研」の GS1 バーコード
(01)14987042146015

科研製薬株式会社
KAKEN
［お問い合わせ先］〒113-8650 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
医薬品情報サービス室　0120-519-874

発売元
科研製薬株式会社
KAKEN
東京都文京区本駒込二丁目28番8号

製造販売元
DAITO ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地