

処方箋医薬品

処方箋医薬品

抗甲状腺剤
日本薬局方 チアマゾール錠

抗甲状腺剤
チアマゾール注

メルカゾール[®]錠2.5mg
メルカゾール[®]錠5mg

メルカゾール[®]注10mg

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報 (DSU) No.309 に掲載される予定です。

2022年6月

あすか製薬株式会社

改訂内容(_____ : 改訂箇所) <メルカゾール錠2.5mg、5mg、メルカゾール注10mg>

改訂後	改訂前																																				
11. 副作用 11.1 省略 11.2 その他の副作用	11. 副作用 11.1 省略 11.2 その他の副作用																																				
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>肝臓</td><td>AST上昇、ALT上昇等</td></tr><tr><td>皮膚</td><td>脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑、<u>多形紅斑</u>等</td></tr><tr><td>消化器</td><td>悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛、めまい、末梢神経異常等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、蕁麻疹、発熱等</td></tr><tr><td>筋・骨格</td><td>こむらがえり、筋肉痛、関節痛</td></tr><tr><td>血液</td><td>好酸球増多</td></tr><tr><td>その他</td><td>CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)</td></tr></tbody></table>		頻度不明	肝臓	AST上昇、ALT上昇等	皮膚	脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑、 <u>多形紅斑</u> 等	消化器	悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等	精神神経系	頭痛、めまい、末梢神経異常等	過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、発熱等	筋・骨格	こむらがえり、筋肉痛、関節痛	血液	好酸球増多	その他	CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>肝臓</td><td>AST上昇、ALT上昇等</td></tr><tr><td>皮膚</td><td>脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑等</td></tr><tr><td>消化器</td><td>悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>頭痛、めまい、末梢神経異常等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹、蕁麻疹、発熱等</td></tr><tr><td>筋・骨格</td><td>こむらがえり、筋肉痛、関節痛</td></tr><tr><td>血液</td><td>好酸球増多</td></tr><tr><td>その他</td><td>CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)</td></tr></tbody></table>		頻度不明	肝臓	AST上昇、ALT上昇等	皮膚	脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑等	消化器	悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等	精神神経系	頭痛、めまい、末梢神経異常等	過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、発熱等	筋・骨格	こむらがえり、筋肉痛、関節痛	血液	好酸球増多	その他	CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)
	頻度不明																																				
肝臓	AST上昇、ALT上昇等																																				
皮膚	脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑、 <u>多形紅斑</u> 等																																				
消化器	悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等																																				
精神神経系	頭痛、めまい、末梢神経異常等																																				
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、発熱等																																				
筋・骨格	こむらがえり、筋肉痛、関節痛																																				
血液	好酸球増多																																				
その他	CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)																																				
	頻度不明																																				
肝臓	AST上昇、ALT上昇等																																				
皮膚	脱毛、色素沈着、痒痒感、紅斑等																																				
消化器	悪心・嘔吐、下痢、食欲不振等																																				
精神神経系	頭痛、めまい、末梢神経異常等																																				
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、発熱等																																				
筋・骨格	こむらがえり、筋肉痛、関節痛																																				
血液	好酸球増多																																				
その他	CK上昇、倦怠感、リンパ節腫脹、唾液腺肥大、浮腫、味覚異常 (味覚減退を含む)																																				
注) このような場合には他の薬剤に切り換えること。症状が軽い場合は、抗ヒスタミン剤を併用し、経過を観察しながら慎重に投与すること。	注) このような場合には他の薬剤に切り換えること。症状が軽い場合は、抗ヒスタミン剤を併用し、経過を観察しながら慎重に投与すること。																																				

以上

～最新の添付文書はこちらから～

メルカゾール[®]錠2.5mg
メルカゾール[®]錠5mg



(01)04987123514514



メルカゾール[®]注10mg



(01)04987123512534

