

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

「使用上の注意」改訂のお知らせ

合成副腎皮質ホルモン剤

日本薬局方 プレドニゾン錠

処方箋医薬品

注意-医師等の処方箋により使用すること

プレドニゾン錠1mg(旭化成)

プレドニゾン錠5mg(旭化成)

Prednisolone Tablets (ASAHI KASEI)

2022年7月

No. 2022-04

製造販売元：旭化成ファーマ株式会社

この度、「使用上の注意」を一部自主改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

(下線部 _____ : 追記箇所)

改 訂 後		改 訂 前	
4. 副作用 (2) その他の副作用 次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。		4. 副作用 (2) その他の副作用 次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。	
頻度 分類	頻度不明	頻度 分類	頻度不明
(略)		(略)	
その他	発熱、疲労感、ステロイド腎症、体重増加、精子数及びその運動性の増減、尿路結石、創傷治癒障害、皮膚・結合組織の菲薄化・脆弱化、徐脈	その他	発熱、疲労感、ステロイド腎症、体重増加、精子数及びその運動性の増減、尿路結石、創傷治癒障害、皮膚・結合組織の菲薄化・脆弱化

2. 改訂理由

○自主改訂

他社のプレドニゾン製品の添付文書記載との整合を図るために、「その他の副作用」に「徐脈」を追記しました。

改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.310に掲載されますので併せてご参照下さい。

最新の電子化された添付文書およびDSUは、PMDAホームページの「医薬品に関する情報」
(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)にてご確認ください。

製造販売元

旭化成ファーマ株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

<製品に関するお問い合わせ先>

くすり相談窓口

☎0120-114-936（9：00～17：45/土日祝、休業日を除く）

<https://www.asahikasei-pharma.co.jp/>