

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年8月

東和薬品株式会社

HMG-CoA還元酵素阻害剤

HMG-CoA還元酵素阻害剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」
ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」
ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」

《ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠》

日本薬局方

ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠2.5mg「トーフ」
ロスバスタチン錠5mg「トーフ」
ロスバスタチン錠10mg「トーフ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____: 追記)

| 改訂後 | | | 改訂前 | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|---------|
| 3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること) | | | 3. 相互作用 2) 併用注意 (併用に注意すること) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| フェブキシostat | 本剤とフェブキシostatを併用したとき、本剤のAUCが約1.9倍、Cmaxが約2.1倍上昇したとの報告がある。 | フェブキシostatがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 | (該当する記載なし) | | |

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項 (自主改訂)

ロスバスタチンカルシウム製剤のCCDS (企業中核データシート) が変更されたため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報 (DSU) No.311 (2022年9月) に掲載の予定です。

最新の電子添文は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ (<https://www.pmda.go.jp>) 及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」 (<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>) に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932