

## 深在性真菌症治療剤

処方箋医薬品

日本薬局方 フルコナゾールカプセル

**フルコナゾールカプセル 50mg「サワイ」**

**フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」**

日本薬局方 フルコナゾール注射液

**フルコナゾール 静注液 50mg「サワイ」**

**フルコナゾール 静注液 100mg「サワイ」**

**フルコナゾール 静注液 200mg「サワイ」**

2022年 9月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

### 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 改訂内容 (下線部改訂又は追加箇所)

改訂後			改訂前		
<b>3. 相互作用</b> 本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。 2)併用注意(併用に注意すること)			<b>3. 相互作用</b> 本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。 2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビル ニルマトレル ビル・リトナ ビル	リトナビルの AUC上昇の報告 がある。 ニルマトレルビ ル・リトナビルの 血中濃度上昇のお それがある。	本剤はこれらの薬剤 の肝臓における主た る代謝酵素である CYP3A4を阻害する ので、併用によりこ れらの薬剤の血中濃 度が上昇することが ある。	リトナビル オキシコドン	これらの薬剤の AUC上昇の報告 がある。	本剤はこれらの薬剤 の肝臓における主た る代謝酵素である CYP3A4を阻害する ので、併用によりこ れらの薬剤の血中濃 度が上昇することが ある。
オキシコドン	オキシコドンの AUC上昇の報告 がある。				

#### 2. 改訂理由

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。



☆ 改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)  
および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。