

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2022年8月

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

深在性真菌症治療剤

# フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 フルコナゾールカプセル100mg「サンド」

日本薬局方 フルコナゾールカプセル

**サンド株式会社**

東京都港区虎ノ門1-23-1

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部) : 変更箇所】

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カルバマゼピン	変更なし	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。	カルバマゼピン	省略	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
変更なし	変更なし		省略	省略	
リトナビル	リトナビルのAUC上昇の報告がある。		リトナビル	これらの薬剤のAUC上昇の報告がある。	
ニルマトレルビル・リトナビル	ニルマトレルビル・リトナビルの血中濃度上昇のおそれがある。		オキシコドン	省略	
オキシコドン	オキシコドンのAUC上昇の報告がある。		トルバプタン	省略	
トルバプタン	変更なし				

【改訂理由】

フルコナゾール製剤の情報に基づき、「3. 相互作用」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No. 311」に掲載されます。

改訂添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) 及び弊社ホームページ「医療関係者向け情報」 (<https://www.sandoz.jp/products>) に掲載されます。

### 【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ  
フリーコール (0120) 982-001 FAX(03) 6257-3633  
受付時間 9:00～17:00(土・日、祝日及び当社休日を除く)