

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2022年8月

東和薬品株式会社

深在性真菌症治療剤

日本薬局方
フルコナゾール注射液
フルコナゾール 静注 50mg「トローワ」
フルコナゾール 静注 100mg「トローワ」
フルコナゾール 静注 200mg「トローワ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
あわせて、医療用医薬品の添付文書等の記載要領改正（新記載要領）に基づく様式変更を行いました。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（_____：追記、_____：削除）

| 改訂後（新記載要領） | | | 改訂前（旧記載要領） | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること） | | | 3. 相互作用 2) 併用注意（併用に注意すること） | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| リトナビル ニルマトレルビル・リトナビル | リトナビルのAUC上昇の報告がある。 ニルマトレルビル・リトナビルの血中濃度上昇のおそれがある。 | 本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。 | リトナビル オキシコドン | <u>これらの薬剤</u> のAUC上昇の報告がある。 | 本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。 |
| オキシコドン | オキシコドンのAUC上昇の報告がある。 | | | | |

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相互作用相手薬の記載との整合を取るため、改訂いたしました。

< 記載整備 >

「torsades de pointes」→「torsade de pointes」

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.311（2022年9月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<https://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932