

注射用抗アルドステロン剤
水分・電解質代謝改善剤

2022年10月

劇薬・処方箋医薬品

カンレノ酸カリウム 静注用 100mg「サワイ」
カンレノ酸カリウム 静注用 200mg「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL：0120(381)999

(注射用カンレノ酸カリウム)

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 改訂内容 (下線部改訂又は追加箇所)

改訂後	改訂前												
<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 4) <u>エプレレノン</u>、<u>エサキセレノン</u>又はタクロリムスを投与中の患者(「相互作用」の項参照)</p> <p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 1) 併用禁忌(併用しないこと)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>エプレレノン (セララ) <u>エサキセレノン</u> (ミネプロ) タクロリムス (プログラフ)</td><td>高カリウム血症が発現することがある。</td><td>機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	エプレレノン (セララ) <u>エサキセレノン</u> (ミネプロ) タクロリムス (プログラフ)	高カリウム血症が発現することがある。	機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。	<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 4) エプレレノン又はタクロリムスを投与中の患者(「相互作用」の項参照)</p> <p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 1) 併用禁忌(併用しないこと)</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>エプレレノン (セララ) タクロリムス (プログラフ)</td><td>高カリウム血症が発現することがある。</td><td>機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	エプレレノン (セララ) タクロリムス (プログラフ)	高カリウム血症が発現することがある。	機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
エプレレノン (セララ) <u>エサキセレノン</u> (ミネプロ) タクロリムス (プログラフ)	高カリウム血症が発現することがある。	機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。											
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
エプレレノン (セララ) タクロリムス (プログラフ)	高カリウム血症が発現することがある。	機序：これらの薬剤と本剤の相加・相乗作用による血清カリウム値の上昇。											

(裏面につづく)



