

使用上の注意事項改訂のお知らせ

鎮痛・抗炎症・解熱剤

日本薬局方

ロキソプロフェンナトリウム錠

<ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」>

謹啓 平素は弊社製品をご愛用賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

このたび、標記製品につきまして、下記の通り使用上の注意事項を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましてご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

改訂内容

改訂前	改訂後
<p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明) 1)~2)(省略)</p> <p>3)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TE N)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑: 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>4)~13)(省略)</p>	<p>4.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明) 1)~2)(変更なし)</p> <p>3)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TE N)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、<u>急性汎発性発疹性膿疱症</u>: 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、<u>急性汎発性発疹性膿疱症</u>があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>4)~13)(変更なし)</p>

以上