

2022年11-12月

日 医 工 株 式 会 社
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

テトラサイクリン系抗生物質製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 注射用ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「タイヨー」

製造販売元 武田テバファーマ株式会社

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ : 自主改訂）

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 省略（変更なし） (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～2) 省略（変更なし） 3) 結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎 結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、倦怠感、体重減少、関節痛、筋肉痛、網状皮斑、しびれ等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。<u>特に6ヵ月以上使用している長期投与例で結節性多発動脈炎が多く報告されている。</u> 4)～13) 省略（変更なし）</p>	<p>4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～2) 省略 3) 結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎 結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、倦怠感、体重減少、関節痛、網状皮斑、しびれ等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 4)～13) 省略</p>

<改訂理由>

- ・同一成分薬の添付文書において、「重大な副作用」の「結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎」の項において、主な症状に「筋肉痛」が追記され、また、「6ヵ月以上使用している長期投与例で結節性多発動脈炎が多く報告されている」ことが追記されたことから、本剤の添付文書においても、同様の注意喚起を追記しました。

<変更ロット・流通予定時期>

変更ロット・流通予定時期については、現段階では未定です。当面の間、新・旧が混在し、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ[®]」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ[®]」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「タイヨー」



(01)14987123409237

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.313」(2022年12月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は以下のホームページに掲載致します。

- 医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>)
- 日医工株式会社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)