

処方箋医薬品

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤

日本薬局方

カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド錠

カデチア[®]配合錠LD「あすか」

カデチア[®]配合錠HD「あすか」

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知により、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.313に掲載される予定です。

2022年11月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ）：改訂箇所

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～12) 省略 13) 肺水腫, 急性呼吸窮迫症候群: 肺水腫があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、直ちに適切な処置を行うこと。また、ヒドロクロチアジド服用後、数分から数時間以内に急性呼吸窮迫症候群が発現したとの報告がある¹⁻⁴⁾。 14)～18) 省略</p>	<p>4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用（頻度不明） 1)～12) 省略 13) 肺水腫: 肺水腫があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、直ちに適切な処置を行うこと。 14)～18) 省略</p>
<p>【主要文献】 1) Rai, A. et al.:Am.J.Respir.Crit.Care Med.2016;193:A1890 2) Jansson, PS. et al.:J.Emerg.Med.2018;55:836-840 3) Vadas, P.:Am.J.Emerg.Med.2020;38:1299.e1-2 4) Kane, SP. et al.:Perfusion.2018;33:320-322 5)～16) 省略</p>	<p>【主要文献】 ←新規 1)～12) 省略</p>

以上

～ 最新の添付文書はこちらから～

カデチア[®]配合錠LD「あすか」
カデチア[®]配合錠HD「あすか」

0104987123512862

