

劇薬、処方箋医薬品

慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤

トアラセット[®]配合錠「あすか」

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知により、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.314 に掲載される予定です。

2023 年 1 月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ：改訂箇所）

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用 1) ～11) 省略 <u>12) 薬剤性過敏症症候群（頻度不明）：初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス6（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。</u></p>	<p>4. 副作用 省略 (1) 重大な副作用 1) ～11) 省略 ← 新規</p>

以上

～ 最新の添付文書はこちらから ～

トアラセット[®]配合錠「あすか」



(01)04987141800026

