

使用上の注意改訂のお知らせ

神経障害性疼痛治療剤

タリージェ[®]錠 2.5mg	タリージェ[®]OD錠 2.5mg
タリージェ[®]錠 5mg	タリージェ[®]OD錠 5mg
タリージェ[®]錠 10mg	タリージェ[®]OD錠 10mg
タリージェ[®]錠 15mg	タリージェ[®]OD錠 15mg

ミロガバリンベシル酸塩製剤

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2022年12月
第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*タリージェ[®]OD錠につきましては、薬価基準未収載です。

1. 改訂の概要

《自主改訂》

「11. 副作用」の項の「11.2 その他の副作用」に「味覚障害」、「味覚不全」、「頭部不快感」、「ジスキネジア」、「複視」、「視力障害」、「視力低下」、「動悸」、「ほてり」、「血圧低下」を追記しました。

2. 改訂内容〔() 自主改訂〕

改訂後				改訂前			
11. 副作用 現行通り 11.2 その他の副作用				11. 副作用 (略) 11.2 その他の副作用			
	5%以上	5%未満	頻度不明		5%以上	5%未満	頻度不明
精神神経系	傾眠、浮動性めまい	体位性めまい、不眠症、意識消失、頭痛、振戦、感覚鈍麻	記憶障害、健忘、構語障害、幻覚、譫妄、味覚障害、 <u>味覚不全、頭部不快感、ジスキネジア</u>	精神神経系	傾眠、浮動性めまい	体位性めまい、不眠症、意識消失、頭痛、振戦、感覚鈍麻	記憶障害、健忘、構語障害、幻覚、譫妄
眼		霧視	<u>複視、視力障害、視力低下</u>	眼		霧視	
血液		好酸球数増加		血液		好酸球数増加	
循環器		起立性低血圧、高血圧	<u>動悸、ほてり、血圧低下</u>	循環器		起立性低血圧、高血圧	
現行通り				(略)			

3. 改訂理由

《自主改訂》

〔11. 副作用〕

本剤との関連性が否定できない症例が集積されたことから、「11.2 その他の副作用」の項に「味覚障害」、「味覚不全」、「頭部不快感」、「ジスキネジア」、「複視」、「視力障害」、「視力低下」、「動悸」、「ほてり」、「血圧低下」を追記しました。

☆本剤の最新の電子添文については、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)及び弊社ホームページ(<https://www.medicalcommunity.jp>)に掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取ることも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

タリージェ錠・OD錠  (01)14987081108708



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

〈製品情報お問い合わせ先〉

第一三共株式会社 製品情報センター

TEL：0120-189-132

〔受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日、当社休日を除く）〕

TLG70S0401
2022年12月作成