

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤  
高尿酸血症治療剤  
フェブキソスタット錠

**フェブキソスタット錠10mg「AFP」**  
**フェブキソスタット錠20mg「AFP」**  
**フェブキソスタット錠40mg「AFP」**  
FEBUXOSTAT Tablets 10mg「AFP」・20mg「AFP」・40mg「AFP」

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2023年1月

**alfresa**  
製造販売元 アルフレッサファーマ株式会社

この度、標記製品につきまして、電子化された添付文書（電子添文）の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容及び最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 記

#### I. 改訂内容 [\_\_\_\_ (下線) 部は追記箇所]

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジダノシン	変更なし	変更なし	ジダノシン	省略	省略
ロスバスタチン	ロスバスタチンの血中濃度が上昇する可能性がある。	本剤がBCRPを阻害することにより、ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、Cmaxが約2.1倍上昇したとの報告がある <sup>2)</sup> 。	該当記載なし		
23. 主要文献 1)変更なし 2)Lehtisalo, M. et al.: Clin Transl Sci. 2020; 13(6): 1236-1243. 3)～32)変更なし			23. 主要文献 1)～31)省略		

## Ⅱ. 改訂理由

### 【自主改訂】

先発製剤で相互作用の相手薬クレストール錠（ロスバスタチン）の併用注意の記載と整合性を図る改訂が行われたことから、本剤においても同様に改訂いたしました。

本改訂内容は医薬品安全対策情報（DSU）（No.314：2023年1月末公開予定）に掲載されます。

最新の電子添文は、PMDA ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）に掲載され、専用アプリ「添文ナビ」を用いて、製品の包装や下記のGS1 バーコードを読み取ることで、PMDA ホームページ上の最新の電子添文をご覧いただけます。

また、弊社の医療用医薬品情報サイト（<https://www.alfresa-pharma.co.jp/iyaku/>）でも、ご覧いただけます。

フェブキシソスタット錠 10mg 「AFP」



(01) 14987274141789

フェブキシソスタット錠 20mg 「AFP」



(01) 14987274141819

フェブキシソスタット錠 40mg 「AFP」



(01) 14987274141840

### 【本改訂内容に関するお問い合わせ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社

医薬安全性情報室

TEL 06-6941-0302 FAX 06-6942-6310