

使用上の注意改訂のお知らせ

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤
高尿酸血症治療剤
処方箋医薬品^{注)}
フェブキソスタット錠

2023年1月

フェブキソスタット錠10mg「杏林」
フェブキソスタット錠20mg「杏林」
フェブキソスタット錠40mg「杏林」
FEBUXOSTAT Tablets

製造販売元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売のフェブキソスタット錠10mg「杏林」/フェブキソスタット錠20mg「杏林」/フェブキソスタット錠40mg「杏林」の「使用上の注意」を一部改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (下線部: 改訂箇所)

改訂後			改訂前		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
—省略—			—省略—		
ロスバスタチン	ロスバスタチンの血中濃度が上昇する可能性 ²⁾ がある。	本剤がBCRPを阻害することにより、ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、C _{max} が約2.1倍上昇したとの報告がある ²⁾ 。			

23. 主要文献

2) Lehtisalo M, et al. : Clin Transl Sci. 2020; 13(6): 1236-43.

2. 改訂理由

相互作用相手薬との整合性を図るため、次のとおり自主改訂いたしました。

- 「併用注意」の項に、「ロスバスタチン」に関する注意喚起を追記いたしました。併せて、主要文献を追加いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載される予定です。なお、改訂後の電子添文は弊社ホームページ<https://www.med.kyorin-rmd.com/>及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ<https://www.pmda.go.jp/>に掲載されています。併せてご利用ください。本製品の電子添文はこちらのGS1コードからご覧ください。

フェブキソスタット錠10mg・20mg・40mg「杏林」



(01)14987060310375



医療関係者向けWebサイト
<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

本件に関する
お問い合わせ

キョーリン リメディオ株式会社 学術部
TEL 0120-960189 FAX 0120-189099