

ー 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。ー

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2023年1月

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤
高尿酸血症治療剤
フェブキソスタット錠

フェブキソスタット錠10mg「明治」

フェブキソスタット錠20mg「明治」

フェブキソスタット錠40mg「明治」

フェブキソスタット口腔内崩壊錠

フェブキソスタットOD錠10mg「明治」

フェブキソスタットOD錠20mg「明治」

フェブキソスタットOD錠40mg「明治」

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2-4-16

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しますのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、「電子化された添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

I. 改訂内容(該当部分のみ)

| 改訂後 | | |
|--|--------------------------|--|
| 10. 相互作用 | | |
| 10.2 併用注意(併用に注意すること)(該当部分のみ) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| ロスバスタチン | ロスバスタチンの血中濃度が上昇する可能性がある。 | 本剤が BCRP を阻害することにより、ロスバスタチンの AUC が約 1.9 倍、 C_{max} が約 2.1 倍上昇したとの報告がある ²⁾ 。 |
| 23. 主要文献(該当部分のみ) | | |
| 2) Lehtisalo M, et al. : Clin Transl Sci. 2020 ; 13 (6) : 1236-1243. | | |

_____ : 自主改訂による改訂箇所

II. 改訂理由

自主改訂

●「併用注意」の改訂

先発医薬品の電子添文における自主改訂に基づき改訂しました。

ーお願いー

弊社医薬品にて副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、下記問い合わせ先又は弊社医薬情報担当者(MR)までご連絡の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。

<製品に関するお問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 フリーダイヤル(0120)093-396 電話(03)3273-3539

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に、最新の電子化された添付文書が掲載されます。また、以下のGS1コードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることで最新の電子化された添付文書等をご参照いただけます。



(01)14987222002438
フェブキソスタット

GVFB202223