

処方箋医薬品

勃起不全治療剤

シルデナフィル錠50mgVI「あすか」

シルデナフィルクエン酸塩錠

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.315に掲載される予定です。

2023年2月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ：改訂箇所）

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 (2) [併用注意] (併用に注意すること)			3. 相互作用 (2) [併用注意] (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
チトクロームP450 3A4阻害薬 リトナビル、 <u>ニルマトレルビル・リトナビル</u> 、 <u>ダルナビル</u> 、 <u>エリスロマイシン</u> 、 <u>シメチジン</u> 、 <u>ケトコナゾール</u> 、 <u>イトラコナゾール</u> 等	リトナビル、エリスロマイシン、シメチジンとの併用により、本剤の血漿中濃度が上昇し、最高血漿中濃度（Cmax）がそれぞれ3.9倍、2.6倍、1.5倍に増加し、血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）がそれぞれ10.5倍、2.8倍、1.6倍に増加した（「慎重投与」の項参照）。	代謝酵素阻害薬によるクリアランスの減少	チトクロームP450 3A4阻害薬 リトナビル、 <u>ダルナビル</u> 、 <u>エリスロマイシン</u> 、 <u>シメチジン</u> 、 <u>ケトコナゾール</u> 、 <u>イトラコナゾール</u> 等	リトナビル、エリスロマイシン、シメチジンとの併用により、本剤の血漿中濃度が上昇し、最高血漿中濃度（Cmax）がそれぞれ3.9倍、2.6倍、1.5倍に増加し、血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）がそれぞれ10.5倍、2.8倍、1.6倍に増加した（「慎重投与」の項参照）。	代謝酵素阻害薬によるクリアランスの減少
省略			省略		

以上

～最新の添付文書はこちらから～

シルデナフィル錠50mgVI「あすか」

0104987123511797

