

劇薬、処方箋医薬品

GnRH アンタゴニスト

レルゴリクス錠

レルミナ[®]錠 40mg

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.315 に掲載される予定です。

2023 年 2 月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ）：改訂箇所

改 訂 後	改 訂 前																														
<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1 粘膜下筋腫のある患者</p> <p>観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。また、一度に大量の出血が認められた場合には、速やかに医療機関に連絡するよう患者に対し注意を与えること。<u>筋腫分娩</u>、重度の不正出血があらわれることがある。</p>	<p>9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.1 合併症・既往歴等のある患者 9.1.1 粘膜下筋腫のある患者</p> <p>観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。また、一度に大量の出血が認められた場合には、速やかに医療機関に連絡するよう患者に対し注意を与えること。重度の不正出血があらわれることがある。</p>																														
<p>11.副作用 省略 11.1 省略 11.2 その他の副作用</p> <table><thead><tr><th></th><th>5%以上</th><th>1～5%未満</th><th>1%未満</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td></td><td>倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫</td><td>動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労</td><td><u>高血圧</u></td></tr></tbody></table>		5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明	省略					その他		倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫	動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労	<u>高血圧</u>	<p>11.副作用 省略 11.1 省略 11.2 その他の副作用</p> <table><thead><tr><th></th><th>5%以上</th><th>1～5%未満</th><th>1%未満</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>省略</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td></td><td>倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫</td><td>動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労</td><td></td></tr></tbody></table>		5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明	省略					その他		倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫	動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労	
	5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明																											
省略																															
その他		倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫	動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労	<u>高血圧</u>																											
	5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明																											
省略																															
その他		倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫	動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労																												

以上

～ 最新の添付文書はこちらから ～

レルミナ[®]錠 40mg

(01)04987123513630

