

「使用上の注意」改訂のお知らせ

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン

タゾピペ[®]配合静注用 2.25 「日医工」

タゾピペ[®]配合静注用 4.5 「日医工」

製造販売(輸入)元 日医工株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂(下線部)しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ : 通知改訂)

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 省略(変更なし) (1)重大な副作用(頻度不明) 1)~10) 省略(変更なし) 11)血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食症候群) <u>血球貪食性リンパ組織球症(頻度不明)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、LDH上昇、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p>	<p>4. 副作用 省略 (1)重大な副作用(頻度不明) 1)~10) 省略 ←追記</p>

<改訂理由>

- ・同一成分薬において「血球貪食性リンパ組織球症」との因果関係が否定できない国内及び海外症例が集積したことから、「重大な副作用」の項に「血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食症候群)」を追記しました。

<変更ロット・流通予定時期>

変更ロット・流通予定時期については、現段階では未定です。当面の間、新・旧が混在し、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

タゾピペ配合静注用「日医工」



(01)14987376263419

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.315」(2023年3月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。