

## 使用上の注意改訂のお知らせ

$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン

**タゾピペ<sup>®</sup>配合静注用2.25「DSEP」**

**タゾピペ<sup>®</sup>配合静注用4.5「DSEP」**

**タゾピペ<sup>®</sup>配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」**

**タゾピペ<sup>®</sup>配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」**

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2023年2月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社

販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。

### 1. 改訂の概要

「重大な副作用」の項に「血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食症候群)」を追記しました<<厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(以下、薬生安通知)による改訂>>。

### 2. 改訂内容〔( ) 薬生安通知による改訂〕

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用 現行通り (1) 重大な副作用(頻度不明) 1)～10) 現行通り 11) <u>血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食症候群)</u>： <u>血球貪食性リンパ組織球症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、LDH上昇、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p>	<p>4. 副作用 略 (1) 重大な副作用(頻度不明) 1)～10) 略</p>

☆詳細は電子化された添付文書（電子添文）をご参照いただきますようお願い申し上げます。  
最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」:

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

・弊社ホームページ:

<https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/>

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

タゾピペ配合静注用、タゾピペ配合点滴静注用バッグ「DSEP」



(01)14987081184689

【お問い合わせ先】

第一三共エスファ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-100-601 受付時間: 平日9:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

【夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先】

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 ☎ 0120-856-838 受付時間: 平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元

**第一三共エスファ株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1