

スピロラクトン錠25mg「ツルハラ」使用上の注意改訂のお知らせ

拝啓、時下益々清祥の段お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であるスピロラクトン錠25mg「ツルハラ」の使用上の注意を下記のとおり自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい〔使用上の注意〕をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆【10.2 併用注意（併用に注意すること）】の項を下記の通り改訂致します。（部追加、部削除）

改訂後			現行		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
【略】	【略】	【略】	【略】	【略】	【略】
カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸 カリウム ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシン II受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタン シレキセチル バルサルタン等 アリスキレン カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン カンレノ酸カリウム シクロスポリン ドロスピレノン	高カリウム血症を誘発することがあるの で、血清カリウム値 を観察するなど十分 注意する。	これらの薬剤 と本剤の相 加・相乗作用に よる血清カリ ウム値の上昇。 危険因子：腎障 害患者、高齢者	カリウム製剤 塩化カリウム グルコン酸カリウム アスパラギン酸 カリウム ACE阻害剤 カプトプリル エナラプリル リシノプリル等 アンジオテンシン II受容体拮抗剤 ロサルタンカリウム カンデサルタン シレキセチル バルサルタン等 アリスキレン カリウム保持性利尿剤 トリアムテレン カンレノ酸カリウム <u>フィネレノン</u> シクロスポリン ドロスピレノン	高カリウム血症を誘 発することがあるの で、血清カリウム値 を観察するなど十分 注意する。	これらの薬剤 と本剤の相 加・相乗作用に よる血清カリ ウム値の上昇。 危険因子：腎障 害患者、高齢者
フィネレノン	血清カリウム値上 昇及び高カリウム 血症が発現する危 険性が増大するお それがあるので、治 療上必要と判断さ れる場合にのみ併 用すること。併用す る場合には、血清カ リウム値をより頻 回に測定するなど 患者の状態を慎重 に観察すること。			【現行記載なし】	
【略】	【略】	【略】	【略】	【略】	【略】

以上

【電子化された添付文書（電子添文）の閲覧について】

製品の外箱等に記載された販売包装単位GS1バーコードを専用のアプリケーション（添文ナビ）で読み取ることで、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページより本製品の最新の電子化された添付文書をご覧頂けます。

また、電子化された添付文書については、弊社ホームページ（<http://www.tsuruhara-seiyaku.co.jp/medical/>）からも閲覧、印刷頂けます。

紙媒体の添付文書をご希望される場合は、お手数をお掛け致しますが、弊社MR又は弊社問合せ先までご連絡ください。

【弊社問合せ先】鶴原製薬株式会社 医薬情報部

TEL：0120-901-758 受付時間 9：00～17：15（土・日、祝祭日、弊社休業日を除く）