

「禁忌」及び「使用上の注意」改訂のお知らせ

5-HT_{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤

劇薬、処方箋医薬品^{注)}

エレクトリプタン臭化水素酸塩錠

エレクトリプタン錠 20mg 「日医工」

製造販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「禁忌」及び「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ ：自主改訂、 ：削除箇所）

改訂後			改訂前		
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1. ～ 6. 省略（変更なし） 7. エルゴタミン，エルゴタミン誘導体含有製剤，他の5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬，HIVプロテアーゼ阻害薬（リトナビル）， <u>あるいはニルマトレルビル・リトナビルを投与中の患者</u> [「相互作用」の項参照]			【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1. ～ 6. 省略 7. エルゴタミン，エルゴタミン誘導体含有製剤，他の5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬， <u>あるいはHIVプロテアーゼ阻害薬（リトナビル，インジナビル硫酸塩エタノール付加物，ネルフィナビルメシル酸塩）を投与中の患者</u> [「相互作用」の項参照]		
3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）			3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略（変更なし）			省略		
HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル (<u>ノービア</u>)	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクロームP450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。	HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル、 <u>インジナビル硫酸塩エタノール付加物、ネルフィナビルメシル酸塩</u>	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクロームP450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。
<u>ニルマトレルビル・リトナビル</u> (<u>パキロビッド</u>)					

<改訂理由>

- 相互作用相手薬の添付文書との整合を図るため、「禁忌」及び「併用禁忌」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」（販売名：パキロビッドパック）を追記しました。
- すでに販売中止・経過措置期間満了となっている「インジナビル硫酸塩エタノール付加物」（販売名：クリキシバン）、「ネルフィナビルメシル酸塩」（販売名：ビラセプト）を、「禁忌」及び「併用禁忌」の項から削除しました。

<変更ロット・流通予定時期>

変更ロット・流通予定時期については、現段階では未定です。当面の間、新・旧が混在し、ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

エレトリプタン錠 20mg 「日医工」



(01)14987376614402

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.316」(2023年4月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。