

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年3月

製造販売元  **日新製薬株式会社**

山形県天童市清池東二丁目3番1号

5-HT_{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤

エルトリプタン錠20mg「日新」

劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（ ____部：追記 _____部：削除 _____部：記載整備）

改訂後	改訂前																			
<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>1. ～6. 現行のとおり</p> <p>7. エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、他の5-HT_{1B/1D}受容体作動薬、HIVプロテアーゼ阻害薬（リトナビル）、あるいはニルマトレルビル・リトナビルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）</p>	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <p>1. ～6. 省略</p> <p>7. エルゴタミン、エルゴタミン誘導体含有製剤、他の5-HT_{1B/1D}受容体作動薬、あるいはHIVプロテアーゼ阻害薬（リトナビル、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、ネルフィナビルメシル酸塩）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）</p>																			
<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 現行のとおり (1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">（略）</td></tr><tr><td>HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル（ノビア）</td><td rowspan="2">本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。</td><td rowspan="2">本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。</td></tr><tr><td>ニルマトレルビル・リトナビル（パキロビッド）</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	（略）			HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル（ノビア）	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。	ニルマトレルビル・リトナビル（パキロビッド）	<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用 省略 (1) 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">（略）</td></tr><tr><td>HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル インジナビル硫酸塩エタノール付加物 ネルフィナビルメシル酸塩</td><td rowspan="2">本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。</td><td rowspan="2">本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	（略）			HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル インジナビル硫酸塩エタノール付加物 ネルフィナビルメシル酸塩	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																		
（略）																				
HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル（ノビア）	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。																		
ニルマトレルビル・リトナビル（パキロビッド）																				
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																		
（略）																				
HIVプロテアーゼ阻害薬 リトナビル インジナビル硫酸塩エタノール付加物 ネルフィナビルメシル酸塩	本剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。																		

改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容（記載整備及び「インジナビル硫酸塩エタノール付加物」の削除を除く）は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報(DSU No.316 2023年4月)に掲載される予定です。
最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) および弊社HP (<https://www.yg-nissin.co.jp/>) に掲載致します。
また、電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下のGS1バーコードを読み取ることで電子添文をご覧いただくことが可能です。

エルトリプタン錠「日新」



(01)14987447245016