— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

「使用上の注意」改訂のお知らせ

尋常性乾癬等 角化症治療剤

マキサカルシトール軟膏25µg/g「PP」

MAXACALCITOL Ointment マキサカルシトール製剤

2023年5~6月

製造販売元 サンファーマ株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。つきましては、今後のご使用に際し、下記内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

記

マキサカルシトール軟膏 25 µ g/g「PP」

【改訂内容】(該当箇所のみ抜粋)

(: 追記修正)

改訂後(旧記載要領)			改訂前(旧記載要領)		
3. 相互作用			3. 相互作用		
併用注意(併用に注意すること)			併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<省略>			<省略>		
PTH製剤 テリパラチド アバロパラチド酢酸塩	高カルシウム血症が あらわれるおそれが ある。	相加作用	PTH製剤 テリパラチド	高カルシウム血症が あらわれるおそれが ある。	相加作用
<省略>			<省略>		

【改訂理由】

1. 自主改訂

先発品(オキサロール軟膏・ローション)の相互作用「併用注意」のPTH製剤にアバロパラチド酢酸塩が追加され、両剤の併用に対する注意喚起がされました。そのため、当該改訂に合わせ本剤においても改訂を行うこととしました。

高カルシウム血症および高カルシウム血症によると考えられる臨床症状(口渇、倦怠感、脱力感、食欲不振、嘔吐、腹痛、筋力低下等)が認められた場合には本剤の使用を中止し、血中カルシウム値、尿中カルシウム値等の生化学検査を行い、必要に応じて輸液等の処置を行ってください。

なお、本剤とテリパラチド又はアバロパラチド酢酸塩との相互作用に関する症例報告は 2023年3月時点ではありません。

本件に関する改訂内容は、「サンファーマ株式会社ホームページ」(https://jp.sunpharma.com/)にも掲載しております。

医薬品安全対策情報 (DSU) No. 317に (2023年5月) 掲載されますので合わせてご参照下さい。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (https://www.pmda.go.jp) 及び、弊社ホームページの「医療関係者の皆様へ」 (https://jp.sunpharma.com/) に掲載致しますので併せてご参照ください。

また、専用アプリ「添文ナビ」で下記 GS1 バーコードを読み取ることでも、最新の電子添文等をご参照頂けます。

マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」

(01)04987047203013

問い合わせ先 サンファーマ株式会社 くすり相談センター

電話番号:0120-22-6880 受付時間:9:00~17:30 (土日、祝祭日は除く)