

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 使用上の注意改訂のお知らせ

慢性心不全治療剤

日本薬局方 カルベジロール錠

カルベジロール錠 1.25mg「タナベ」

CARVEDILOL Tablets 1.25mg

慢性心不全治療剤

頻脈性心房細動治療剤

日本薬局方 カルベジロール錠

カルベジロール錠 2.5mg「タナベ」

CARVEDILOL Tablets 2.5mg

持続性 高血圧・狭心症治療剤

慢性心不全治療剤

頻脈性心房細動治療剤

日本薬局方 カルベジロール錠

カルベジロール錠 10mg「タナベ」

CARVEDILOL Tablets 10mg

持続性 高血圧・狭心症治療剤

頻脈性心房細動治療剤

日本薬局方 カルベジロール錠

カルベジロール錠 20mg「タナベ」

CARVEDILOL Tablets 20mg

2023年5月

ニプロESファーマ株式会社

このたび、標記製品につきまして、【使用上の注意】を改訂しましたのでお知らせ致します。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い致します。

■ 改訂内容

改訂後（下線 部：追記改訂箇所）	改訂前
<p>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</p> <p>(1) ～ (7) (略)</p> <p>(8) 未治療の褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）</p> <p>(9) ～ (10) (略)</p>	<p>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</p> <p>(1) ～ (7) (略)</p> <p>(8) 未治療の褐色細胞腫の患者（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）</p> <p>(9) ～ (10) (略)</p>
<p>〈用法・用量に関連する使用上の注意〉</p> <p>1. 褐色細胞腫又はパラガングリオーマの患者では、単独投与により急激に血圧が上昇するおそれがあるので、α遮断薬で初期治療を行った後に本剤を投与し、常にα遮断薬を併用すること。</p> <p>(2. 以下略)</p>	<p>〈用法・用量に関連する使用上の注意〉</p> <p>1. 褐色細胞腫の患者では、単独投与により急激に血圧が上昇するおそれがあるので、α遮断薬で初期治療を行った後に本剤を投与し、常にα遮断薬を併用すること。</p> <p>(2. 以下略)</p>

改訂後（下線 部：追記改訂箇所）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等 （略）	臨床症状・措置方法 （略）	機序・危険因子 （略）	薬剤名等 （略）	臨床症状・措置方法 （略）	機序・危険因子 （略）
交感神経刺激剤 アドレナリン等	(1) 相互の薬剤の効果が減弱する。 (2) 血圧上昇、徐脈があらわれることがある。	(1) 本剤のβ遮断作用により、アドレナリンの作用が抑制される。また、アドレナリンのβ刺激作用により本剤のβ遮断作用が抑制される。 (2) 本剤のβ遮断作用により、α刺激作用が優位になると考えられている。	交感神経刺激剤 アドレナリン等	血圧上昇があらわれることがある。	本剤のβ遮断作用により、α刺激作用が優位になると考えられている。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

〈改訂理由〉

先発医薬品に合わせて改訂いたしました。

- ・ここでお知らせした内容は、ニプロESファーマ株式会社ホームページ (<https://www.nipro-es-pharma.co.jp>) 「医療機関向け情報」でもご覧いただけます。
- ・「使用上の注意」改訂の内容は、医薬品安全対策情報(DSU) No. 317 (2023年5月発行予定)に掲載されます。また医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) にも掲載されます。

お問い合わせ先
ニプロ株式会社
医薬品情報室
専用ダイヤル 0120-226-898

製造販売
ニプロESファーマ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号