

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年7月
沢井製薬株式会社キャンディン系抗真菌剤
劇薬、処方箋医薬品
注射用ミカファンギンナトリウムミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後(新記載要領)	改訂前(旧記載要領)
<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.2 配合禁忌</p> <p>本剤は他剤と配合したとき、濁りが生じることがある。また、本剤は塩基性溶液中で不安定であるため、力価の低下が生じることがある。下表に配合直後に濁りが生じる主な薬剤及び配合直後に力価低下が生じる主な薬剤を示す。</p> <p>配合直後に濁りが生じる主な薬剤</p> <p>〈略：変更なし〉</p> <p>配合直後に力価低下が生じる主な薬剤</p> <p>アンピシリンナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アシクロビル、ガンシクロビル、アセタゾラミドナトリウム</p>	<p>8. 適用上の注意</p> <p>3) 配合禁忌：本剤は他剤と配合したとき、濁りが生じることがある。また、本剤は塩基性溶液中で不安定であるため、力価の低下が生じることがある。表1に配合直後に濁りが生じる主な薬剤を、表2に配合直後に力価低下が生じる主な薬剤を示す。</p> <p>表1 配合直後に濁りが生じる主な薬剤</p> <p>〈略〉</p> <p>表2 配合直後に力価低下が生じる主な薬剤</p> <p>アンピシリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アシクロビル、ガンシクロビル、アセタゾラミド</p>

2. 改訂理由

自主改訂

記載整備のため、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。

ミカファンギンNa点滴静注用50mg/75mg「サワイ」



(01)14987080358029

