

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年7月

製造販売元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地

高血圧症・狭心症治療薬（持続性Ca拮抗薬）

劇薬 処方箋医薬品^注

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠

アムロジピン錠2.5mg「杏林」

アムロジピン錠5mg「杏林」

アムロジピン錠10mg「杏林」

AMLODIPINE Tablets

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」

アムロジピンOD錠5mg「杏林」

アムロジピンOD錠10mg「杏林」

AMLODIPINE OD Tablets

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売の**アムロジピン錠2.5mg「杏林」**／**アムロジピン錠5mg「杏林」**／**アムロジピン錠10mg「杏林」**／**アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」**／**アムロジピンOD錠5mg「杏林」**／**アムロジピンOD錠10mg「杏林」**の電子化された添付文書（以下、電子添文）の「使用上の注意」の記載内容を改訂しましたのでお知らせ申し上げます。今後のご使用に際しまして、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（自主改訂：下線部 改訂箇所）

改訂後（新記載要領）			改訂前（旧記載要領）		
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
—省略—			—省略—		
CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル ニルマトレルビル ・リトナビル イトラコナゾール 等	エリスロマイシン及び ジルチアゼムとの 併用により、本剤の 血中濃度が上昇した との報告がある。	本剤の代謝が競合的 に阻害される可能性 が考えられる。	CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール 等	エリスロマイシン及び ジルチアゼムとの 併用により、本剤の血 中濃度が上昇したと の報告がある。	本剤の代謝が競合的 に阻害される可能性 が考えられる。
—省略—			—省略—		

2. 改訂理由

- 相互作用相手薬との整合性を図るため、「併用注意」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」を追記いたしました。
- 医療用医薬品の添付文書の記載要領変更に伴う改訂を行いました。

◇裏面もご覧ください

- 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載の予定です。
- 最新の電子添文は、下記ホームページでご参照くださるようお願いいたします。

PMDA ホームページ

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>



弊社 医療関係者向け Web サイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>



- 「添文ナビ®」を用い、下記 GS1 コードを読み取ることで最新の電子添文等が閲覧できます。

アムロジピン錠 2.5mg・5mg・10mg 「杏林」

アムロジピン OD 錠 2.5mg・5mg・10mg 「杏林」



(01)14987060306378



医療関係者向けWebサイト

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

本件に関する
お問い合わせ

キョーリン リメディオ株式会社 学術部

TEL 0120-960189

FAX 0120-189099