

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

電子添文改訂のお知らせ

2023年8月

劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠

サンド株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1

アムロジピン錠 2.5mg「サンド」

アムロジピン錠 5mg「サンド」

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

アムロジピンOD錠 2.5mg「サンド」

アムロジピンOD錠 5mg「サンド」

アムロジピンOD錠 10mg「サンド」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容（_____：変更箇所）】

| 改訂後 | | | 改訂前 | | |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| 【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） | | | 【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 変更なし | | | 省略 | | |
| CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル ニルマトレ ルビル・ リトナビル イトラコナ ゾール等 | エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。 | 本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。 | CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナ ゾール等 | エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。 | 本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。 |
| 変更なし | | | 省略 | | |

【改訂理由】

同一成分薬の情報に基づき「3. 相互作用 併用注意」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No. 319」に掲載されます。

改訂電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) 及び弊社ホームページ「医療関係者向け情報」 (<https://www.sandoz.jp/products>) に掲載されます。

【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ

TEL (0120) 982-001 FAX (03) 6257-3633

受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日及び当社休日を除く)