

## 使用上の注意改訂のお知らせ

日本薬局方

## アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

高血圧症・狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬

## アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」

## アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」

## アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」

この度、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書（以下、電子添文）をご参照下さいますようお願い申し上げます。

## 1. 改訂内容（抜粋）

（追記箇所 下線：\_\_\_\_\_）

改訂後			改訂前		
<b>3. 相互作用</b> <b>併用注意</b> （併用に注意すること）			<b>3. 相互作用</b> <b>併用注意</b> （併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル <u>ニルマトレルビル・リトナビル</u> イトラコナゾール 等	エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。	CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール 等	エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。	本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。

## 2. 改訂理由

## 「相互作用：併用注意」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」を追記（自主改訂）

相手薬であるニルマトレルビル・リトナビル（パキロビッドパック、ファイザー株式会社）の添付文書において、本剤との併用は注意とされているため、本剤においても整合を取り「相互作用：併用注意」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」を追記致しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093 受付時間 9:00～17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)
- 医療関係者向けホームページ <https://www.med.takeda-teva.com>

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）No. 319（2023年8月発行）に掲載される予定です。

最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）に掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(アムロジピンOD錠「武田テバ」) (01)14987123416143