

重要な情報が記載されています
ので、必ずお読み下さい。

令和 5 年 7 月 - 8 月

金沢市久安 3 丁目 406 番地
辰巳化学株式会社

解熱鎮痛剤
アセトアミノフェン錠
アセトアミノフェン錠200mg「TCK」

「効能又は効果」の変更、
「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和5年7月26日付でアセトアミノフェン錠 200mg 「TCK」の「効能又は効果」変更（適応拡大）が承認されました。また、それに伴い「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

■ 改訂箇所

~~~~~ 自主改訂による変更箇所

| 改 訂 後                                                                                                                                                                                              | 改 訂 前                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 効能又は効果<br>○ <u>各種疾患及び症状における鎮痛</u><br><br>現行の通り                                                                                                                                                  | <b>【効能又は効果】</b><br>(1) <u>下記の疾患並びに症状の鎮痛</u><br><u>頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋</u><br><u>肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、</u><br><u>がんによる疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、</u><br><u>変形性関節症</u><br>(2)、(3) 省略                                                                               |
| 6. 用法及び用量<br><u>〈各種疾患及び症状における鎮痛〉</u><br>現行の通り                                                                                                                                                      | <b>【用法及び用量】</b><br><u>効能又は効果 (1) の場合</u><br>省略                                                                                                                                                                                                      |
| 8. 重要な基本的注意<br>8.1 解熱鎮痛剤による治療は原因療法ではなく<br><u>対症療法であることから原因療法があればこ</u><br><u>れを行うこと。</u><br>8.2 省略<br>8.3 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次<br>の事項を考慮すること。<br>・発熱、疼痛の程度を考慮し投与すること。<br>・原則として同一の薬剤の長期投与を避ける<br>こと。 | <b>【使用上の注意】</b><br>2. 重要な基本的注意<br>(1) <u>解熱鎮痛剤による治療は原因療法ではな</u><br><u>く対症療法であることに留意すること。</u><br><br>(2) 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、<br>次の事項を考慮すること。<br>1) 発熱、疼痛の程度を考慮し投与すること。<br>2) 原則として同一の薬剤の長期投与を避<br>けること。<br>3) <u>原因療法があればこれを行うこと。</u><br>(3) ~ (9) 省略 |

| 改訂後                                                         | 改訂前                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.4 慢性疾患に対し本剤を用いる場合には、薬物療法以外の療法も考慮すること。<br><br>8.5 ~ 8.7 省略 | (10) 慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合には、薬物療法以外の療法も考慮すること。 |

なお、今回の改訂に併せて、新記載要領（平成 29 年 6 月 8 日付）に準じた様式へと改訂致します。

改訂内容につきましては、令和 5 年 9 月発行予定の「医薬品安全対策情報(DSU)No.320」に掲載されます。また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ(<https://www.tatsumi-kagaku.com/>)及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)に掲載されますので、併せてご利用下さい。なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。



(01)14987124022626