

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年9月

東和薬品株式会社

EPA 製剤

日本薬局方 イコサペント酸エチル

イコサペント酸エチルカプセル 300mg 「トーフ」

このたび、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____: 追記)

| 改訂後 | 改訂前 | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------------------------------------|--|---|------------------------|
| <p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 2) <u>ミフェプリストン・ミソプロストールを投与中の患者（「相互作用」の項参照）</u></p> | <p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 (該当する記載なし)</p> | | | | | | |
| <p>3. 相互作用 1) <u>併用禁忌（併用しないこと）</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>ミフェプリストン・ミソプロストール メフィーゴパック</u></td><td><u>ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。</u></td><td><u>イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。</u></td></tr></tbody></table> | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | <u>ミフェプリストン・ミソプロストール メフィーゴパック</u> | <u>ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。</u> | <u>イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。</u> | <p>3. 相互作用 ←新設</p> |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | | | | | |
| <u>ミフェプリストン・ミソプロストール メフィーゴパック</u> | <u>ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。</u> | <u>イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。</u> | | | | | |

2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」の項（自主改訂）

相互作用相手薬の記載との整合性を図るため、改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.320（2023年9月）に掲載の予定です。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」(<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>)に掲載いたします。

また、専用アプリ「添文ナビ」で右記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。



製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

TEL 0120-108-932

●●医療関係者向けメール配信サービスのご案内●●

電子添文改訂等の適正使用情報に関するウェブサイト
更新情報をメールにてお知らせいたします。

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/mail.html>

