

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年9—10月

経皮吸収型 アルツハイマー型認知症治療剤

劇薬
処方箋医薬品^(注)

リバスタグミンテープ 4.5mg「久光」 RIVASTIGMINE Tapes 4.5mg「Hisamitsu」

リバスタグミンテープ 9mg「久光」 RIVASTIGMINE Tapes 9mg「Hisamitsu」

リバスタグミンテープ 13.5mg「久光」 RIVASTIGMINE Tapes 13.5mg「Hisamitsu」

リバスタグミンテープ 18mg「久光」 RIVASTIGMINE Tapes 18mg「Hisamitsu」

リバスタグミン経皮吸収型製剤

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

このたび、標記製品の**使用上の注意**を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

〔____：下線部改訂箇所〕

改訂後	現行
<p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(1) 本剤の投与により、徐脈、房室ブロック、<u>QT延長</u>、<u>Torsade de pointes</u>等があらわれることがあるので、特に心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）を有する患者、<u>電解質異常</u>（低カリウム血症等）のある患者や<u>QT延長</u>又はその既往歴・家族歴のある患者等では、重篤な不整脈に移行しないよう観察を十分に行うこと。</p> <p>(略)</p>	<p>2. 重要な基本的注意</p> <p>(1) 本剤の投与により、徐脈、房室ブロック等があらわれることがあるので、特に心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）を有する患者や電解質異常（低カリウム血症等）のある患者等では、重篤な不整脈に移行しないよう観察を十分に行うこと。</p> <p>(略)</p>
<p>4. 副作用</p> <p>(略)</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) 狭心症、心筋梗塞、徐脈、房室ブロック、洞不全症候群、<u>QT延長</u>（いずれも頻度不明） 狭心症、心筋梗塞、徐脈、房室ブロック、洞不全症候群、<u>QT延長</u>があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>	<p>4. 副作用</p> <p>(略)</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) 狭心症、心筋梗塞、徐脈、房室ブロック、洞不全症候群（いずれも頻度不明） 狭心症、心筋梗塞、徐脈、房室ブロック、洞不全症候群があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>

【改訂理由】

令和5年8月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づき、本剤の「重要な基本的注意」、「副作用」の項を改訂しました。

【お問い合わせ先】

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
TEL. 0120-381332 FAX. (03)5293-1723
受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)」に改訂後の電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されますので、ご参照ください。また、以下のバーコードを「添文ナビ」で読み取ることで、電子化された添付文書及び関連文書を閲覧いただけます。

リバスチグミンテープ4.5mg「久光」



リバスチグミンテープ9mg「久光」



リバスチグミンテープ13.5mg「久光」



リバスチグミンテープ18mg「久光」

