

# 使用上の注意改訂のお知らせ

## 抗精神病剤

# 日本薬局方 クエチアピンフマル酸塩錠

# クエチアピン錠25mg「DSEP」 クエチアピン錠100mg「DSEP」 クエチアピン錠200mg「DSEP」

劇薬、処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

2023年9月

製造販売元 第一三共エスファ株式会社 販売提携 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。 つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象を ご経験の際には、弊社 MR に速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂の概要

- (1)「禁忌」の項の「アドレナリンを投与中の患者」及び「相互作用(併用禁忌)」の項の「アドレナリン」について、「歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く」旨を追記しました≪自主改訂≫。
- (2) 「相互作用(併用注意)」の項に「アドレナリン含有歯科麻酔剤」を追記しました≪自主改訂≫。
- **2. 改訂内容**〔( )自主改訂〕

# 改 訂 後改 訂 前2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)<br/>2.1~2.2 現行通り2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)<br/>2.1~2.2 略<br/>2.3 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンを<br/>アナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域<br/>における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)[10.1、13.2 参照]2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)<br/>2.1~2.2 略<br/>2.3 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンを<br/>アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)[10.1、13.2 参照]2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)<br/>2.1~2.2 略<br/>2.3 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンを<br/>アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)[10.1、13.2 参照]2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)<br/>2.1~2.2 略<br/>2.3 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンを<br/>アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)[10.1、13.2 参照]

改 訂 後	改 訂 前
<b>10. 相互作用</b> 現行通り	10. 相互作用 略
10.1 併用禁忌 (併用しないこと)	10.1 併用禁忌(併用しないこと)
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子	薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
アドレナリン (アナフィラキシー の救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) (ボスミン) [2.3、13.2 参照] アドレナリンの作用 アドレナリン作動性 α、 β - 受容体の刺激 剤であり、本剤のα - 受容体遮断作用により、β - 受容体の刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強される。	アドレナリン (アナフィラキシー (アナフィラキシー の救急治療に使 用する場合を除く) (ボスミン) [2.3、13.2 参照] アドレナリンの作用 アドレナリン作動性 α、β-受容体の刺激 剤であり、本剤のα-受容体遮断作用により、β-受容体の刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強される。
10.2 併用注意 (併用に注意すること)	10.2 併用注意 (併用に注意すること)
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子	薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
現行通り	略
アドレナリン含有 歯科麻酔剤 リドカイン・ア ドレナリン 重篤な血圧降下を起 こすことがある。 アドレナリン作動性 α、 β - 受容体の刺激 剤であり、本剤の α - 受容体遮断作 用により、β - 受容体の刺激作用が優位となり、血圧降 下作用が増強されるおそれがある。	

☆詳細は電子化された添付文書(電子添文)をご参照いただきますようお願い申し上げます。 最新の電子添文は以下のホームページに掲載しております。

・PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」: https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html

・弊社ホームページ:

https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/

また、専用アプリ「添文ナビ」より、GS1 データバーを読み取ることでも電子添文等をご参照いただけます。

[お問い合わせ先]

第一三共工スファ株式会社 お客様相談室 **0120-100-601** 受付時間: 平日9:00~17:30 (土·日·祝日・弊社休日を除く)

[夜間・休日 緊急時のお問い合わせ先]

日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 🔯 0120-856-838 受付時間:平日17:30~翌9:00及び土・日・祝日・弊社休日

製造販売元

# 第一三共エスファ株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売提携

第一三共株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1