医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

No. 23-29

気管支拡張剤

テオフィリンドライシロップ20% 「タカタ」

テオフィリン徐放性ドライシロップ

劇薬・処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

2023年10月

製造販売高田製薬株式会社

このたび、標記製品の【**使用上の注意**】の項を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。 今後の本剤のご使用に際しましては、以下の内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (波線は改訂箇所)

改訂後	改訂前
【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 (1) 本剤又は他のキサンチン系薬剤に対し重篤な副作用の既往歴のある患者 (2) 12時間以内にアデノシン(アデノスキャン)を使用する患者(「3. 相互作用」の項参照)	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 本剤又は他のキサンチン系薬剤に対し重篤な副作用 の既往歴のある患者
【使用上の注意】 3. 相互作用 (1) 併用禁忌(併用しないこと) 薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 アデノシン 本剤によりアデノシ 本剤はアデノシン受 アデノスキャン 本剤によりアデノシ 本剤はアデノシンの作 用を減弱させる。 しまる 記血 き 断に 影響を 及 ばすことが ある。 アディシン (アデノス	【使用上の注意】 3. 相互作用 記載なし
きれた)を投与する 場合は12時間以上の 間隔をあけること。	

2. 改訂理由

自主改訂

- ●【禁忌】の項に「12時間以内にアデノシン(アデノスキャン)を使用する患者」を追記
- ●「3. 相互作用(1)併用禁忌」の項に「アデノシン」を追記

相互作用相手薬の記載との整合性をとるため、上記薬剤を記載いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の医薬品安全対策情報 (DSU) No. 321に 掲載される予定です。

改訂後の電子化された添付文書(電子添文)全文につきましては、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」(https://www.pmda.go.jp/)並びに弊社ホームページ(https://www.takataseiyaku.co.jp/)でご参照いただけます。

また専用アプリ「添文ナビ[®]」よりGS1バーコードを読み取る事でも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

<GS1コード> テオフィリンドライシロップ「タカタ」



くお問い合わせ先> 高田製薬株式会社 くすり相談室 電話:0120-989-813