

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2023年11月
日本新薬株式会社

経口糖尿病用剤
劇薬、処方箋医薬品^{注)}
日本薬局方メトホルミン塩酸塩錠

グリコラン[®]錠250mg

Glycoran[®] Tablets

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

1.改訂の内容（ 部：改訂箇所、 部：削除箇所）

改訂後			改訂前		
10.相互作用 省略			10.相互作用 省略		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(省略)			(省略)		
(4) その他			(4) その他		
<u>OCT2、MATE1、 又は MATE2-K を阻害する薬剤</u> シメチジン ドルテグラビル ビクテグラビル バンデタニブ イサブコナゾニ ウム硫酸塩 ピミテスピブ等 [16.7 参照]	本剤の血中濃度 が上昇し、作用 が増強するおそ れがある。観察 を十分に行い、 必要に応じて本 剤を減量するな ど慎重に投与す ること。	<u>OCT2、MATE1、 又は MATE2-K</u> を介した本剤の 腎排泄が阻害さ れると考えられ ている。	シメチジン ドルテグラビル ビクテグラビル バンデタニブ [16.7 参照]	本剤の血中濃度 が上昇し、作用 が増強するおそ れがある。観察 を十分に行い、 必要に応じて本 剤を減量するな ど慎重に投与す ること。	<u>これらの薬剤 の腎臓での有 機カチオン輸 送系阻害作用 により、本剤の 排泄が阻害さ れると考えら れている。</u>
(省略)			(省略)		

2. 改訂理由

自主改訂

10.2 併用注意（併用に注意すること）

イサブコナゾニウム硫酸塩（クレセンバ[®]カプセル、クレセンバ[®]点滴静注用）、ピミテスピブ（ジェセリ[®]錠）等の「10.2 併用注意」の項において OCT2 及び MATE1 及び MATE2-K の基質となる薬剤としてメトホルミンが記載され、併用注意に設定されていることから本剤も記載を合わせました。

添付文書閲覧アプリの「添文ナビ」を起動し、右の GS1 バーコードを読み取るとグリコラン錠の「最新の添付文書」等が表示されます。



《改訂後の添付文書情報は、日本新薬株式会社ホームページ (<https://med.nippon-shinyaku.co.jp/>) でご覧いただけます。》

医薬品添付文書改訂情報は PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 (<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) に最新添付文書及び医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。併せてご利用ください。

日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町 14