

処方箋医薬品

勃起不全治療剤

シルデナフィルクエン酸塩錠

# シルデナフィル錠50mgVI「あすか」

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.322に掲載される予定です。

2023年11月

あすか製薬株式会社

改訂内容（      ：改訂箇所）

改訂後（新記載要領）			改訂前（旧記載要領）		
<b>10. 相互作用</b> 省略 <b>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</b> 省略 <b>10.2 併用注意（併用に注意すること）</b>			<b>【使用上の注意】</b> <b>3. 相互作用</b> 省略 (1) <b>【併用禁忌】</b> （併用しないこと） 省略 (2) <b>【併用注意】</b> （併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
チトクロームP450 3A4阻害薬 リトナビル ニルマトレルビル リトナビル ダルナビル エリスロマイシン シメチジン ケトコナゾール イトラコナゾール <u>エンシトレルビル</u> <u>フマル酸等</u>	リトナビル、エリスロマイシン、シメチジンとの併用により、本剤の血漿中濃度が上昇し、最高血漿中濃度（C <sub>max</sub> ）がそれぞれ3.9倍、2.6倍、1.5倍に増加し、血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）がそれぞれ10.5倍、2.8倍、1.6倍に増加した <sup>5)-7)</sup> 。低用量（25mg）から投与を開始するなど慎重に投与すること。	代謝酵素阻害薬によるクリアランスの減少	チトクロームP450 3A4阻害薬 リトナビル、 ニルマトレルビル リトナビル、 ダルナビル、 エリスロマイシン、 シメチジン、 ケトコナゾール、 イトラコナゾール 等	リトナビル、エリスロマイシン、シメチジンとの併用により、本剤の血漿中濃度が上昇し、最高血漿中濃度（C <sub>max</sub> ）がそれぞれ3.9倍、2.6倍、1.5倍に増加し、血漿中濃度-時間曲線下面積（AUC）がそれぞれ10.5倍、2.8倍、1.6倍に増加した（「慎重投与」の項参照）。	代謝酵素阻害薬によるクリアランスの減少
省略			省略		

以上

～最新の電子添文はこちらから～

シルデナフィル錠50mgVI「あすか」

01)04987123511797

