

「使用上の注意」改訂のお知らせ

選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）

劇薬、処方箋医薬品^注

エスシタロプラムシュウ酸塩

エスシタロプラム錠 10mg 「日医工」

エスシタロプラム錠 20mg 「日医工」

製造販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（ : 自主改訂、 ~~~~~ : 削除箇所）

改訂後					改訂前				
10. 相互作用					10. 相互作用				
10.1 併用禁忌（併用しないこと）					10.1 併用禁忌（併用しないこと）				
薬剤名等		臨床症状・措置方法		機序・危険因子	薬剤名等		臨床症状・措置方法		機序・危険因子
省略（変更なし）					省略				
ピモジド [2.3、11.1.4、16.7.2 参照]		本剤のラセミ体であるシタロプラムとピモジドとの併用により、QT延長が発現したとの報告がある。		機序は不明である。	ピモジド <u>オーラップ</u> [2.3、11.1.4、16.7.2 参照]		本剤のラセミ体であるシタロプラムとピモジドとの併用により、QT延長が発現したとの報告がある。		機序は不明である。
11. 副作用					11. 副作用				
省略（変更なし）					省略				
11.2 その他の副作用					11.2 その他の副作用				
	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
省略（変更なし）					省略				
その他		回転性めまい、耳鳴、多汗症	副鼻腔炎、味覚異常、脱毛、コレステロール上昇、血中ナトリウム低下、乳汁漏出、胸部不快感、寝汗、羞明、霧視、過換気、尿糖陽性	視覚異常、散瞳、 <u>高プロラクチン血症</u>	その他		回転性めまい、耳鳴、多汗症	副鼻腔炎、味覚異常、脱毛、コレステロール上昇、血中ナトリウム低下、乳汁漏出、胸部不快感、寝汗、羞明、霧視、過換気、尿糖陽性	視覚異常、散瞳

<改訂理由>

- ・同一成分薬における添付文書の改訂に基づき、その他の副作用の項に「高プロラクチン血症」を追記しました。
- ・オーラップ（販売名）が本邦で販売中止となったことから、併用禁忌の項から販売名を削除しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ^{てんぶん}®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ^{てんぶん}®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

エシタロプラム錠「日医工」



(01)14987376270806

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.323」(2024年1月発行)に掲載の予定です。
また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>)
ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載致します。

エシタロプラムシュウ酸塩 23-045A