

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年1月
沢井製薬株式会社

高血圧・狭心症・不整脈治療剤

劇薬、処方箋医薬品

日本薬局方 メトプロロール酒石酸塩錠

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」

メトプロロール酒石酸塩錠 40mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（取り消し線部削除箇所）

改訂後(新記載要領)	改訂前(旧記載要領)
<p>13. 過量投与</p> <p>13.2 処置</p> <p>13.2.1 過度の徐脈</p> <p>アトロピンを静注する。効果不十分な場合にはβ刺激剤(ドブタミン等)を投与する。又は一時的にペースメーカーを使用する。</p> <p>13.2.2 過度の低血圧</p> <p>低血圧には昇圧剤(アドレナリン、ドパミン、ドブタミン等)を投与する。</p> <p>13.2.3 心不全</p> <p>利尿剤、ジギタリス製剤を投与する。</p> <p>13.2.4 気管支痙攣</p> <p>β_2刺激剤又はアミノフィリンを静注する。</p> <p>これらの処置の間は患者を常に観察下におくこと。</p> <p>また、過度の徐脈、過度の低血圧、心不全の処置には、グルカゴンが有効な場合もある。</p>	<p>8. 過量投与</p> <p>2) 処置：</p> <p>○過度の徐脈</p> <p>アトロピンを静注する。効果不十分な場合にはβ刺激剤(ドブタミン等)を投与する。又は一時的にペースメーカーを使用する。</p> <p>○過度の低血圧</p> <p>低血圧には昇圧剤(アドレナリン、ドパミン、ドブタミン等)を投与する。</p> <p>○心不全</p> <p>利尿剤、ジギタリス製剤を投与する。</p> <p>○気管支痙攣</p> <p>β_2刺激剤(サルブタモール等)又はアミノフィリンを静注する。</p> <p>これらの処置の間は患者を常に観察下におくこと。</p> <p>また、過度の徐脈、過度の低血圧、心不全の処置には、グルカゴンが有効な場合もある。</p>

2. 改訂理由

自主改訂

サルブタモール静注用製剤が販売されていないことから、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg/40mg「サワイ」



(01)14987080033711



沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目 2-30
TEL : 0120-381-999