

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2024年2月

経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェンタニル経皮吸収型製剤

劇薬、麻薬、処方箋医薬品^(注)

フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」
フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」
フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」
フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」
フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」

フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」
フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」
フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」
フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」
フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」
フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」
フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」
フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」

フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」
フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」
フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社
東京都中央区京橋 2-4-16

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（部：改訂箇所）

改訂後	改訂前
13. 過量投与 13.1 症状 フェンタニルの過量投与時の症状として、薬理作用の増強により重篤な換気低下を示す。また、フェンタニルの過量投与により白質脳症が認められている。	13. 過量投与 13.1 症状 フェンタニルの過量投与時の症状として、薬理作用の増強により重篤な換気低下を示す。

2. 改訂理由

自主改訂による改訂

先発製剤の CCDS（Company Core Data Sheet：企業中核データシート）変更に基づき、改訂いたしました。

今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No. 324（2024年3月）に掲載予定です。

本剤の改訂後の電子添文は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載しております。

また、専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等を参照いただけます。

フェンタニル1日用テープ「ユートク」



(01)14987235062009

フェンタニル1日用テープ「明治」



(01)14987222002834

フェンタニル3日用テープ「ユートク」



(01)14987235062054

フェンタニル3日用テープ「明治」



(01)14987222712832

【お問い合わせ先】祐徳薬品工業株式会社 学術研修部

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番32号 オーシャン博多ビル

TEL. 092-271-7702 FAX. 092-271-6405