

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

注意事項等情報改訂のお知らせ

5-HT_{1B/1D}受容体作動型片頭痛治療剤

エレクトリプタン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠

エレクトリプタン OD錠 20mg「アメル」

劇薬
処方箋医薬品
注意-医師等の処方箋により使用すること

Eletriptan OD Tablets [AMEL]

2024年3月
共和薬品工業株式会社
大阪市北区中之島3-2-4

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『エレクトリプタン OD錠 20mg「アメル」』の【注意事項等情報】を改訂致しますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【改訂内容】(下線—部 改訂箇所)

改訂後			現行電子添文(2023年12月改訂)		
10. 相互作用 —現行のとおり—			10. 相互作用 —略—		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
—現行のとおり—			—略—		
飲食物 グレープフルーツジュース	本剤の作用が増強するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクロームP450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。	飲食物 グレープフルーツジュース	本剤の作用が増強するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクロームP450 3A4により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。
エンシトレビル フマル酸	本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	エンシトレビルフマル酸のチトクロームP450 3Aに対する阻害作用により、本剤の代謝が阻害されることが考えられる。	(新設)		
—現行のとおり—			—略—		

【改訂理由】

以下の項目を改訂し、注意を喚起することと致しました。

自主改訂

「10. 相互作用/10.2 併用注意」の項:

相互作用相手薬記載との整合を図るため、「エンシトレビル フマル酸」に関する記載を追加しました。

以上

これらの情報は、2024年4月に発行予定のDSU No.325に掲載致します。

なお、改訂情報は弊社ホームページ <http://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/> 及びPMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に改訂指示内容、最新の電子添文並びに医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されます。あわせてご利用下さい。

お問い合わせ先: 共和薬品工業株式会社 安全管理部 大阪市北区中之島 3-2-4  0120-041-189

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

注意事項等情報改訂のお知らせ

5-HT_{1B/1D}受容体作動型片頭痛治療剤

エレクトリプタン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠

エレクトリプタン OD錠 20mg「アメル」

Eletriptan OD Tablets [AMEL]

劇薬
処方箋医薬品
注意 - 医師等の処方箋により使用すること

2024年3月

販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元

共和薬品工業株式会社

大阪市北区中之島3-2-4

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『エレクトリプタン OD錠 20mg「アメル」』の【注意事項等情報】を改訂致しますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【改訂内容】(下線——部 改訂箇所)

改 訂 後			現行電子添文 (2023年12月改訂)		
10. 相互作用 — 現行のとおり —			10. 相互作用 — 略 —		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
— 現行のとおり —			— 略 —		
飲食物 グレープフルーツ ジュース	本剤の作用が増強するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4 により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。	飲食物 グレープフルーツ ジュース	本剤の作用が増強するおそれがある。	本剤は、主として肝代謝酵素チトクローム P450 3A4 により代謝され、代謝酵素阻害薬によりクリアランスが減少する。
エンシトレルビル フマル酸	本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	エンシトレルビルフマル酸のチトクローム P450 3A に対する阻害作用により、本剤の代謝が阻害されることが考えられる。	(新設)		
— 現行のとおり —			— 略 —		

(裏面へつづく)

【改訂理由】

以下の項目を改訂し、注意を喚起することと致しました。

自主改訂

「10. 相互作用／10.2 併用注意」の項：

相互作用相手薬記載との整合を図るため、“エンシトレルビル フマル酸”に関する記載を追加しました。

【DSU掲載】

使用上の注意改訂情報は、2024年4月発行予定の「医薬品安全対策情報（DSU）No. 325」に掲載されます。

以上

今回の使用上の注意改訂等を反映した電子化された添付文書情報につきましては、以下よりご確認ください。

- ・日本ジェネリック株式会社 医療関係者向けサイト (<https://medical.nihon-generic.co.jp/>)
- ・医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・「添文ナビ[®]」にて個装箱等に表示のGS1バーコードを読み取る。

「添文ナビ[®]」のインストールや使用方法は日薬連のホームページをご覧ください。

(<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/>)

**お問合せ先：日本ジェネリック株式会社
安全管理部 TEL：03-6810-0502**

エレトリプタン0D錠20mg「アメル」



(01)14987792101616

J-AM004-002