

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

注意事項等情報改訂のお知らせ

アルツハイマー型認知症治療剤
ガラントミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠

ガラントミンOD錠4mg「アメル」
ガラントミンOD錠8mg「アメル」
ガラントミンOD錠12mg「アメル」
Galantamine OD Tablets [AMEL]

創薬、処方箋医薬品®

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

2024年4月
共和薬品工業株式会社
大阪市北区中之島3-2-4

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『ガラントミンOD錠4mg、8mg、12mg「アメル」』の【注意事項等情報】を改訂致しますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【改訂内容】(下線—部 改訂箇所)

改訂後			現行電子添文 (2023年7月改訂)		
10. 相互作用 本剤は主としてCYP2D6及びCYP3A4により代謝される。			10. 相互作用 本剤は主としてCYP2D6及びCYP3A4により代謝される。		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
コリン作動薬 アセチルコリン ベタネコール等 コリンエステラーゼ 阻害剤 ネオスチグミン等	コリン刺激作用が増強され、著しい心拍数の低下等がおこる可能性がある。	本剤とこれらの薬剤のコリン作動作用が相加的に増強される。	コリン作動薬 アセチルコリン ベタネコール アクラトニウム等 コリンエステラーゼ 阻害剤 ネオスチグミン等	コリン刺激作用が増強され、著しい心拍数の低下等がおこる可能性がある。	本剤とこれらの薬剤のコリン作動作用が相加的に増強される。
—現行のとおり—			—略—		

【改訂理由】

以下の項目を改訂し、注意を喚起することと致しました。

自主改訂

「10. 相互作用/10.2 併用注意」の項：

アクラトニウムは製造販売されていないため削除しました。

以上

これらの情報は、2024年5月に発行予定のDSU No.326に掲載致します。

なお、改訂情報は弊社ホームページ <http://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/> 及びPMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に改訂指示内容、最新の電子添文並びに医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されます。あわせてご利用下さい。

お問い合わせ先：共和薬品工業株式会社 安全管理部 大阪市北区中之島3-2-4  0120-041-189