

- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 -

注意事項等情報改訂のお知らせ

キサンチン系気管支拡張剤
テオフィリン徐放性製剤

テオドール[®] 顆粒 20%
テオドール[®] 錠 50mg
THEODUR[®] Granules, Tablets

キサンチン系気管支拡張剤
テオフィリン徐放性製剤

テオドール[®] 錠 100mg
テオドール[®] 錠 200mg
THEODUR[®] Tablets

2024年5月

製造販売元 田辺三菱製薬株式会社

このたび、標記製品につきまして、注意事項等情報を改訂しましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願いいたします。

■改訂概要

改訂項目	改訂内容	改訂理由
用法及び用量に関連する注意	小児気管支喘息治療・管理ガイドラインの年表記を削除しました。	記載整備
主要文献	小児気管支喘息治療・管理ガイドラインの年表記を2017から2023に変更しました。	記載整備

■改訂内容

改訂後(下線部:追記箇所)	改訂前
7. 用法及び用量に関連する注意 〈効能共通〉 7.1 略 〈気管支喘息〉 7.2 小児に投与する場合の投与量、投与方法等については、学会のガイドライン等、最新の情報を参考に投与すること。[9.7.1 参照] 〈参考:日本小児アレルギー学会:小児気管支喘息治療・管理ガイドライン ¹⁾ 〉 6~15歳では8~10mg/kg/日(1回4~5mg/kg 1日2回)より開始し、臨床効果と血中濃度を確認しながら調節する。	7. 用法及び用量に関連する注意 〈効能共通〉 7.1 略 〈気管支喘息〉 7.2 小児に投与する場合の投与量、投与方法等については、学会のガイドライン等、最新の情報を参考に投与すること。[9.7.1 参照] 〈参考:日本小児アレルギー学会:小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2017 ¹⁾ 〉 6~15歳では8~10mg/kg/日(1回4~5mg/kg 1日2回)より開始し、臨床効果と血中濃度を確認しながら調節する。
23. 主要文献 1) 滝沢琢己, 手塚純一郎, 長尾みづほ, 吉原重美 監修:一般社団法人日本小児アレルギー学会編 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2023, 協和企画 2023	23. 主要文献 1) 荒川浩一, 足立雄一, 海老澤元宏, 藤澤隆夫監 修:日本小児アレルギー学会編 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2017, 協和企画 2017

■改訂理由

＜医薬安通知によらない改訂＞

【用法及び用量に関連する注意】【主要文献】

「7.用法及び用量に関連する注意」に参考情報として記載している「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン」(一般社団法人日本小児アレルギー学会編)に 2023 年度版(2023 年 11 月)が発行されたため、上記のとおり改訂いたしました。

- 注意事項等情報改訂の内容は、医薬品安全対策情報(DSU)No.326(2024 年 5 月発行)に掲載される予定です。
- 電子化された添付文書は、下記ウェブサイトにて閲覧できますので併せてご参照ください。

- 田辺三菱製薬株式会社 <https://medical.mt-pharma.co.jp/>
- PMDA <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

- 「添文ナビ」※で医薬品の外箱等に記載された GS1 バーコードを読み取ると PMDA ウェブサイト上の最新の電子化された添付文書を閲覧できます。

※ 使い方は、こちらをご参照ください。

https://www.dsri.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi_HowToUse.pdf

- GS1 バーコード

テオドール顆粒 20%・錠 50 mg

テオドール錠 100 mg・200 mg



(01)14987128302250



(01)14987128302298

※ダウンロードはこちらから

iOS 版

Android 版



【お問い合わせ先】 田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター [専用ダイヤル 0120-753-280 (弊社営業日の 9:00~17:30)]

24-003