

重要な情報が記載されています
ので、必ずお読み下さい。

令和 6 年 5 月

金沢市久安3丁目406番地
辰巳化学株式会社

アレルギー性疾患治療剤
日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和6年5月付でフェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「TCK」及びフェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「TCK」の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

■ 改訂箇所

~~~~~ 自主改訂による改訂箇所

| 改 訂 後                               |                             |                                  | 改 訂 前                               |           |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 10. 相互作用<br>10.2 併用注意（併用に注意すること）    |                             |                                  | 10. 相互作用<br>10.2 併用注意（併用に注意すること）    |           |         |
| 薬剤名等                                | 臨床症状・措置方法                   | 機序・危険因子                          | 薬剤名等                                | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| 現行の通り                               |                             |                                  | 省略                                  |           |         |
| 水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照] | 現行の通り                       | 現行の通り                            | 水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照] | 省略        | 省略      |
| アパルタミド                              | 本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。 | P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。 |                                     |           |         |

なお、他の項は現行の通りとする。

### ■ 改訂理由

CCDS の変更による。

改訂内容につきましては、令和6年5月発行予定の「医薬品安全対策情報(DSU)No.326」に掲載されます。  
また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ(<https://www.tatsumi-kagaku.com/>)及び独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)に掲載されますので、併せてご利用下さい。  
なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧頂くことが可能です。



(01)14987124142119